

## علائم بی خوابی

- ✓ دشواری در به خواب رفتن
- ✓ بیدار شدن بعد از چند ساعت خوابیدن
- ✓ بیدار شدن زود هنگام در صبح
- ✓ خستگی یا خواب آلودگی در طول روز
- ✓ عدم تمرکز
- ✓ افزایش اشتباهات در انجام کارها
- ✓ ناتوانی در انجام کامل کارهای روزمره
- ✓ نگرانی مداوم در مورد بی خوابی
- ✓ تحریک پذیری
- ✓ افسردگی یا سایر اختلالات روانی
- ✓ بیقراری در هنگام خواب

### چطور بر بی خوابی غلبه کنید

۱. زمان خوابیدن خود را مشخص و منظم کنید. سعی کنید طوری زندگی خود را مدیریت کنید که همیشه در یک زمان معین بخوابید و بیدار شوید. حتی زمانی که خسته هستید یا زمانی که احساس خستگی نمی کنید هم این کار را انجام دهید.
۲. از چرت زدن در طول روز خودداری کنید. ممکن است با چرت زدن در طول روز احساس خوبی پیدا کنید و شمارا سرحال کند، اما این کار ریتم شبانه روزی شما را تغییر می دهد.
۳. فقط زمانی به بستر روید که قصد خوابیدن دارید. گاهی اوقات بی خوابی ناشی از بیش برانگیختگی قبل از خواب است. بیشتر افراد وقتی که می خواهند مطالعه کنند، تلویزیون تماشا کنند، مکالمه تلفنی داشته باشند و حتی زمانی که غمگین هستند به بستر می روند که این خود باعث ایجاد اضطراب و بیش برانگیختگی می شود. بنابراین زمانی باید به بستر بروید که قصد خوابیدن دارید. در اتاق دیگری مطالعه کنید یا با تلفن صحبت کنید. از اتاق خواب فقط برای خواب استفاده نمائید.



۳

## علل بی خوابی

به طور کل علل بی خوابی به عوامل مختلفی بستگی دارد که ما در این مبحث به چند مورد از آن ها می پردازیم.

۱- علل روان شناختی یا روانپردازی: بیشتر اختلالات روان ممکن هست موجب بی خوابی شوند، به طور مثال اختلالات خلقي، اختلالات اضطرابي و ...

۲- علل جسماني: انواع بیماری های جسمی موجب مداخله در فرآيند خواب می شوند. به عنوان مثال کمر دردها، سردردها، مشکلات گوارشي، کمبود برخی ویتامين ها در بدن و ...

۳- الگوي سبک زندگی ناسالم: سبک زندگي ما در بی خوابی تاثير مستقيم دارد، به طور مثال خوردن بيش از حد مواد غذائي که کافيين دارند از جمله چاي، قهوه و همين طور خوردن غذاهاي ستيگين، نداشتن تحرک كافي در طول روز، خوابیدن بيش از حد در طول روز و .... هم باعث ایجاد مشکلات خواب می شوند.

۴- علل محیطی: عوامل محیطی هم در خواب ما می توانند مداخله کنند از جمله سرد يا گرم بودن اتاق خواب ما، سر و صدای بيش از حد محیط اطراف، تعداد بالاي افراد خانواده، نداشتن حریم خصوصی، برنامه کاري سنگين روزانه و ...



۲

### بسه تعالی

خواب يكی از معمولی ترین و چشمگیرترین رفتارهای انسان محسوب می شود، تقریباً یک سوم زندگی روزمره انسان را در بر می گیرد و فرآیندی است که مغز برای کارکرد صحیح به آن نیاز دارد، زیرا محرومیت طولانی از خواب به تخریب شدید جسمی و شناختی می انجامد نتایج و پژوهش های مختلف نشان داده است دوره های طولانی محرومیت از خواب گاهی باعث ایجاد توهمند و هذیان ها می شود.

برخی افراد به طور طبیعی خواب کوتاه تری دارند و برای انجام با کفایت عملکرد روزمره، نیاز به ۶ ساعت خواب در طول شبانه روز دارند، در مقابل برخی افراد پرخواب هستند و برای انجام با کفایت کارکرد روزمره خود به بیش از ۹ ساعت خواب در طول شبانه روز دارند.

با وجود متفاوت بودن ساعات خواب مورد نیاز هر فرد، به طور میانگین بزرگسالان به ۷ تا ۸ ساعت خواب شبانه نیاز دارند و حدود یک سوم افراد بالغ در طول عمر خود نوعی اختلال خواب را تجربه می کنند که در این میان بی خوابی، شایع ترین و شناخته شده ترین اختلال خواب است.

### انواع بی خوابی

۱- بی خوابی گذرا: بین چند روز تا یک هفته طول می کشد، این بی خوابی بیشتر تحت تاثیر فشارهای زندگی و استرس های روزمره است.

۲- بی خوابی حاد: این نوع بی خوابی بین ۳ هفته تا ۶ ماه طول می کشد، معمولاً تحت تاثیر بیماری های جسمی یا قطع برخی داروهای مصرفی اتفاق می افتد و یا تحت تاثیر استرس های طولانی مدت است.

۳- بی خوابی مزمن: به بی خوابی که بیش از یک سال طول بکشد، اطلاق می شود، این بی خوابی معمولاً تحت تاثیر اختلالات روانی اتفاق می افتد و ممکن است سال ها طول بکشد و مشکلات جدی در سلامت فرد بوجود آورد.

۱



سازمان امور انسانی  
دستگاههای سلامت و سینه‌اندازی



دانشگاه گیلان  
معاونت دانشجویی  
مرکز مشاوره و سبک زندگی

## سبک زندگی، سلامت خواب (بی خوابی، علل و راهکارهای کنار آمدن)



الله دل ازد

متخصص روان شناسی بالینی  
مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه گیلان

### ۷. مصرف برخی نوشیدنی‌ها و غذاها در شب را کاهش دهید یا حذف کنید

گاهی دستشویی رفتن مکرر برای اجابت مزاج موجب اخلال در خواب می‌شود. به طور کلی از مصرف مایعات، محصولات کافشین‌دار، غذاهای سنگین، چرب و شیرین در وعده شام بپرهیزید.

### ۸. اگر خوابتان نمی‌آید از بستر خارج شوید

اگر بیش از ۱۵ دقیقه در بستر هستید و خوابتان نمی‌برد، برخیزید و به اتاق دیگری بروید. به افکار منفی خود بپردازید و آن‌ها را به چالش بکشید.

### ۹. سعی نکنید به زور بخوابید

این کار فقط ناکامی شما را بیشتر کرده و در نتیجه بیشتر احساس اضطراب و افسردگی می‌کنید. بهتر است هر وقت خواب به سراغتان آمد به بستر بروید. شاید متناقض به نظر برسد، ولی اگر می‌خواهید به خواب بروید، تلاش نکنید که بخوابید.

### ۱۰. رفتارهای ایمنی بخش خود را حذف کنید

برای مقابله با اضطراب ناشی از بی خوابی، باید رفتارهای خرافی خود نظیر وارسی کردن مکرر ساعت، شمردن، بی حرکت ماندن در بستر و تکرار جملاتی مانند «نگران نباش» را مجدداً ارزیابی کنید. سعی کنید این افکار را شناسایی کرده و از انجام آن‌ها خودداری کنید. مثلاً ساعت را از تخت خود دور کنید یا افکار وارد شده به ذهن تان را کنترل نکنید و فقط مشاهده گر آن‌ها باشید.

### منابع

- لبهی، رابرт؛ هولند، استفان ج؛ مک‌گین، لاتاک. (۲۰۱۲). مدخلات و طرح‌های درمانی برای افسردگی و اختلال‌های اضطرابی. ترجمه مهدی اکبری، مسعود چبني فروزان (۱۳۹۴). تهران: انتشارات ارجمند.
- سلیمانی، ربابه؛ سعادت، فرشید؛ الهی، معصومه. (۱۳۹۱). خواب. رشت: انتشارات سمام.
- کالین، کارنی؛ ادینگر، مای؛ جک، دی. بی خوابی و اضطراب، ترجمه منصور بیرامی، محسن سودمند نیری، حسین فرا باگی. (۱۳۹۲). تهران: انتشارات آوای نور
- مورین، چارلز؛ روان شناسی بی خوابی، ترجمه علیرضا بخششی، آنیتا لشکریان (۱۳۸۱). بزد: انتشارات دانشگاه یزد

۴. اضطراب را با خود به بستر نبرید از بحث کردن و انجام تکاليف چالش زا قبل از خواب اجتناب کنید. قبل از خواب، خود را کاملاً آرام کنید. فعالیت‌های آرامش‌بخش یا غیر چالش زا انجام دهید.

۵. نگرانی‌ها و فکر کردن درباره فعالیت‌های فردا را به قبل یا بعد از زمان خوابیدن موكول کنید. بیشتر بی خوابی‌ها به خاطر فعالیت‌های ذهنی زیاد است. حداقل سه ساعت قبل از خواب، درگیر افکار نگران کننده نشوید. اگر در بستر دراز کشیده‌اید و نگران چیزی هستید، آنجا را ترک کرده و این نگرانی‌ها را یادداشت کنید و فردا صبح به آن بپردازید.

۶. احساسات خود را تخلیه کنید گاهی اوقات بی خوابی نتیجه درگیر شدن در هیجان‌ها و احساسات آزاردهنده است. در نظر گرفتن زمانی برای پرداختن به هیجان‌ها به عنوان «اوقاتی برای هیجان‌ها» چندین ساعت قبل از خواب، بسیار مفید خواهد بود.

