



- مریبان سلامت  
۱- کارکنان  
۲- داوطلبین سلامت و مریبان همسان



این بسته آموزشی توسط سازمان مردم نهاد جامعه پیشگیری از ایدز و بر اساس مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت تبیه و تدوین شده است و به تایید اداره ایدز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسیده است

## شعار CAP : باهم، قویتر هستیم



[www.shepmode.com](http://www.shepmode.com)

آدرس وب سایت :



## تقدیم به : شهدای، به پاس جانفشاری شان در راه تامین امنیت و سلامت کشور

تقدیم به : زنان و مردانی که می کوشند تا کشور خود را به جایی برسانند که مستحق آن است.

- ۷ عامل ایجاد بیماری و نحوه بیماری زایی آن را توضیح دهدند.
- ۸ راههای انتقال و پیشگیری بیماری ایدز را توضیح دهند.
- ۹ گروههای پرخطر از لحاظ ابتلاء به بیماری ایدز را نام ببرند.
- ۱۰ آدرس مراکز مشاوره شبد محل سکونت خود را نام ببرند.
- ۱۱ معنای خوبشتن را بیان کنند.
- ۱۲ رفتار مناسب در مقابل تقاضای رفتارهای پرخطر را توضیح دهند.
- ۱۳ نقش مردم در قبال کنترل و پیشگیری از بیماری ایدز را شرح دهند.
- ۱۴ طرز صحیح برخورد با بیماران مبتلا به ایدز را بیان کنند.

## اهداف آموزشی :

انتظار می رود فرآیندان عزیز پس از پایان دوره بتوانند:

-۱ بیماریهای نوپدید و باز پدید را تعریف کنند.

-۲ علت گسترش بیماری ایدز در جهان را توضیح دهند.

-۳ سمبول حمایت از بیماران ایدز را بیان کنند.

-۴ آمار و ارقام جهانی و کشوری مبتلایان به ایدز را بیان کنند.

-۵ وضعیت کشور ایران از نظر بیماری ایدز را شرح دهند.

-۶ وجه تشابه ایدز با پدیده های اجتماعی را شرح دهند.



Part (1-5)

بیماریهای نوپدید : ایدز  
بیماریهای بازپدید : سل ، سوزاک و سیفلیس

Figure (1-1)



بیماری HIV/AIDS یک بیماری نوپدید محسوب میشود که تقریباً بیش از ۳۰ سال از عمر آن می گذرد !!

Part (1-6)

سوال : به نظر شما علت گسترش شدید این بیماری در جوامع خصوصاً در بین نسل جوان چیست ؟

جواب: ۱- جهل ۲ - انکار


باید گفت که: نقص در نگرش صحیح و مثبت  $\leftarrow$  انکار  
نقص در دانش  $\leftarrow$  جهل  
(عدم آگاهی از در معرض خطر بودن و سایر خطرهای اجتماعی و اقتصادی و ....)  
انکار (پاک کردن صورت مسئله)  
نقص در سکوت  $\leftarrow$  ترس



## HIV/AIDS


Part (3-1)

ویروس نقص ایمنی انسانی / سندروم نقص ایمنی اکتسابی



سوال: HIV+ مثبت یعنی چه؟

Figure (3-1)



شورای امنیت

## HIV/AIDS تاریخچه بیماری

Part (3-2)

۱. ۵ زوئن ۱۹۸۱: اولین گزارش در مورد ۵ بیمار مبتلا به ذات الریه غیر عادی در مردان همجنس گرا.
۲. ۷ ژانویه ۱۹۸۳: گزارش انتقال همین بیماری از فرد مبتلا به دوشیک جنسی موثر.
۳. ۲۰ می ۱۹۸۳: جداسازی ویروس HIV از یک فرد مبتلا به AIDS در پاریس.
۴. ۱۹۹۳: اعلام ایدز به عنوان مهمترین عامل مرگ در افراد ۴۴-۲۵ ساله امریکائی.
۵. ۱۹۹۶: تاسیس واحد UNAIDS در سازمان ملل
۶. ۲۰۰۰: بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متعدد: ایدز امنیت همه مردم جهان را به خطر انداخته است

و در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی است

Figure (3-2)




Figure (3-4)




Figure (3-3)

## توزیع بیماری در جهان؟

Part (3-3)

جنوب صحراي آفریقا:

۲۴/۷۰۰/۰۰۰ نفر (بیشترین موارد ابتلا HIV/AIDS در جهان)

ایدز اولین علت مرگ در آفریقا و چهارمین علت مرگ در جهان



درخواست کمک یک زوج آسیایی

مبتلا به HIV/AIDS

گسترش افجحاري  
ایدز در آسیا، به  
این دلایل که:

- ۰ هر یک دقیقه ۵ جوان مبتلا می شوند.
- ۰ در کامبوج ۸۰۰/۰۰۰ نفر HIV+ هستند
- ۰ در کشورهای عربی، خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از ۲۳۰/۰۰۰ نفر HIV+ هستند.
- ۰ در تایلند ۵۰۰/۰۰۰ نفر HIV+ هستند.
- ۰ روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی بیش از ۱/۱۰۰/۰۰۰ نفر بیمار HIV/AIDS دارد.
- ۰ در هند تعداد مبتلایان از ۲۰/۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۹ به ۶/۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۰ رسیده است.

۳۰۰۰۰۰



Slide 3



## آخرین آمار و ارقام جهان

تا پایان سال UNAIDS , WHO

Part (4-1)

مردم زنده مبتلا به HIV در این سال

تعداد موارد جدید در این سال

مرگ و میر بعلت AIDS در این سال

حدهود ۶۰۰۰ مورد جدید در هر روز

نفر

توجه:  حدهود ۴۰۰۰ مورد مرگ در هر روز

نفر

نفر

توجه: بروای به روز کردن آمارها میتوانید به وب سایت [www.shepmode.com](http://www.shepmode.com) مراجعه کنید.

## اهداف ۹۰-۹۰ برنامه مشترک سازمان ملل تا سال ۲۰۲۰

Part (4-2)

%۹۰

%۹۰

%۹۰

در ۹۰٪ کسانی که تحت درمان هستند،  
تکثیر ویروس در بدن شان به حداقل رسیده باشد.۹٪ افرادی که از ابتلای خود آگاه هستند،  
تحت مراقبت و درمان باشند.۹٪ مبتلایان،  
از ابتلای خود آگاه باشند

## آخرین آمار و ارقام ایران

Part (4-3)

آمار ثبت شده: بیش از 

تخمین تعداد مبتلایان به HIV/AIDS بیش از ۱۰۰/۰۰۰ نفر !!

سوال؟ به نظر شما علت تقاضا زیاد دو آمار ثبت شده و تخمینی فوق چیست؟



توجه: خطر: توجه: بررسی روند آماری چند سال اخیر مبتلایان به HIV/AIDS در ایران نشان میدهد که متاسفانه:


figure (4-1)

- ❖ تعداد و درصد مبتلایان از طریق ارتباط جنسی محافظت نشده در حال افزایش است!
- ❖ همچنین تعداد و درصد مبتلایان زن نسبت به مرد نیز در حال افزایش است!

**خطر!**

## بررسی تغییر الگو و روش‌های انتقال ایدز در ایران از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۲

Part (4-4)




با دقت در نمودار مقابل مشخص میشود که کل بیماران ثبت شده (زنگ سبز) و همچنین موارد ابتلا با اعتیاد تزریقی (زنگ آبی) در ایران تا سال ۸۲ در حال افزایش بود و از آن به بعد رو به کاهش گذاشته است.


ولی متاسفانه روند ابتلا به ایدز از طریق ابتلا به روش جنسی (زنگ قرمز) در طی این سال‌ها، **همواره** در حال افزایش بوده است.

## تاریخچه ورود و الکوی گسترش HIV/AIDS در ایران!

Part (5-1)


**مدل تئوری همه گیری HIV/AIDS در جهان در ۱۰۰ سال آینده!**

Part (5-3)



► کشورهای غربی در مرحله رسیدن به جمعیت عمومی توانسته اند جلوی انتشار بیماری را بگیرند.

► در کشورهای آفریقایی متاسفانه بیماری وارد جمعیت عمومی شده و منجر به مرگ گسترده شده است.

**در حال حاضر** با توجه به نمودار فوق:

► در کشورهای جنوب شرقی آسیا بیماری در حال ورود به جمعیت عمومی است.

► در ایران هم بیماری در حال رسیدن به اوج خود در بین گروههای پر خطر میباشد.

## وضعیت کشورهای جهان

Part (6-1)



Figure (6-4)




Figure (6-3)




Figure (6-2)



BMJ

Figure (6-1)

ایدز در آفریقا!!

## ایدز را به چه پدیده هایی تشبیه کرده اند؟

Part (6-2)

۱۰٪ کوههای یخی شناور در آب اقیانوسها قابل مشاهده هستند ، ۹۰٪

آن زیر آب بوده و در نگاه سطحی و گذرانده نمی شود . ولی موجود هست و واقعیت دارد . وضعیت بیماری ایدز در کشورهای خاورمیانه به کوه یخ تشبیه شده است !

## (۱) پدیده کوه یخ (Iceberg)

Figure (6-5)



سونامی موجهای سهمگین دریایی هستند که در اثر زمین لرزه در اقیانوسها تولید می شوند و بسیار ویرانگر هستند . اشاره می شود ، کشورهایی که فرصت آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز را از دست بدھند ( و حقیقتاً فرصت اندک است ) ، همه گیری ایدز همانند موجهای قدرتمند سونامی جوامع انسانی آن کشورها را در خواهد نوردید ، همانند کشورهای آفریقایی که متأسفانه در بعضی از آنها بیش از نیمی از جمعیت یک کشور مبتلا به HIV/AIDS می باشد !

## (۲) پدیده سونامی (Tsunami)


Figure (6-6)



همانطور که می دانید کشتی تایتانیک (پیشرفت ترین و عظیم الجنه توین ساخته بشر در سال ۱۹۱۲) قرار بود از انگلستان عازم آمریکا شود . ولی متأسفانه در طول مسیر بعلت غفلت دیده بانان کشته ، در اثر برخورد باکوه یخی ، غرق شد و بسیاری از مسافران — آن از بین رفتهند .

## (۳) فاجعه تایتانیک (TITANIC peril)

Figure (6-7)



وجه اشتراک بین فاجعه تایتانیک و همه گیری بیماری ایدز :

(۱) مسافرین کشتی تایتانیک از همه طبقات جامعه (ثروتمند — طبقه متوسط— فقیر)

بودند . ایدز هم یک بیماری است که همه طبقات جامعه میتوانند به آن مبتلا شوند .

(۲) غرق شدن کشتی تایتانیک به علت غفلت دیده بانان آن و برخورد باکوه یخ بود .

جوامع پیشرفت امروزی هم به دلیل غفلت دیده بانان سلامت جامعه ( مردم و مسئولین )

در خطر تهدید برخورد باکوه یخ ایدز هستند .



## عامل ایجاد بیماری

Part (7-1)




Figure (7-1)

عامل ایجاد کننده بیماری ایدز **ویروس** نقص ایمنی انسانی (HIV) می باشد. این ویروس در تمام مایعات بدن فرد مبتلا وجود دارد. ولی، انتقال بیماری از طریق تماس مایعات زیر صورت می پذیرد.

**خون (Blood)** — ترشحات جنسی مردانه و زنانه و شیر مادر و مایع آمنیوتیک (مایعی که جنین در داخل رحم مادر در آن شناور است)

**دو نکته**

Part (7-2)

ashk و بزانه نمی توانند آلوده کننده باشند، مگر اینکه آغشته به خون شوند.  
عمر ویروس در محیط خشک بیرون، کوتان و در حد چند ساعت است.



Figure (7-2)



در عرض ۳ تا ۶ هفته اول  
علایم عمومی مثل:  
تب،  
گلودرد  
بی اشتیایی و...

**مراحل سه کانه بیماری**

Part (7-4)


**۱- عفونت اولیه**
**۲- مرحله نهفتگی** ← بدون علایم ظاهری


Figure (7-4)

ضعف شدید سیستم ایمنی بدن  
بروز عفونتها فرست طلب  
کاهش وزن شدید  
و نهایتاً مرگ




Figure (7-3)



Part (7-5)

ورود ویروس به بدن

ورود ویروس به بدن

Part (8-1)




Figure (8-1)




Figure (8-4)



Figure (8-3)



Figure (8-2)

## نقاشی های دو کودک برنده جایزه

Part (8-2)




Figure (8-6)



Figure (8-5)

## راههای انتقال بیماری

### تماس جنسی :

بیشترین انتقال در:


کسانی که دارای شرکای جنسی متعدد هستند.

کسانی که هم زمان به یک عفونت آمیزشی دیگر مبتلا هستند.

و بین هم جنس گرایان (علی الخصوص مرد با مرد)

احتمال انتقال بیماری در تماس های :

مقعدی (oral) بیشتر از مهبلی (vaginal) بیشتر از دهانی (oral)



افراد پر خطر از نظر ابتلاء HIV/AIDS از راه انتقال جنسی


به نظر شما در یک رابطه جنسی احتمال انتقال: از زن به مرد بیشتر است یا مرد به زن؟




**جواب:** مرد به زن بیشتر از زن به مرد، تا چندین برابر. لذا خانمهای در خطر بیشتری هستند.

**علت:** تفاوت ساختمان اندام تناسلی زن و مرد موجب می شود که مخاط اندام تناسلی زن در معرض تماس بیشتری با ترشحات (اسپرم) آلوده قرار گیرد و همچنین بقای اسپرم آلوده در اندام تناسلی زن بیشتر است.

استفاده مشترک از سرنگ و وسایل تزریق آلوده: تزریق  
با سرنگ و یا وسایل تزریق آلوده بصورت مشترک  
(شایع در بین مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر)



خون: از طریق خون و  
فرآورده های خونی و ابزار آلوده در تماسهای شغلی



### انتقال از مادر به کودک:

حین بارداری %۳۰

حین زایمان %۶۵

دوران شیردهی %۲۰



## راههای عدم انتقال بیماری

Part (10-1)



Figure (10-1)

توجه:

باور کنید که :

ویروس ایدز از طریق تماسهای عادی مانند استفاده از استخر شنا، توالت عمومی و حمام، وسایط نقلیه عمومی، گزش حشرات، عطسه، سرفه، ظروف غذا خوری، دست دادن و روبوسی منتقل نمی شود.

(%) ۸۰ راه انتقال HIV/AIDS در سطح جهان تماس جنسی است.

Part (10-2)

کودکان از همان ابتدا باید با HIV/AIDS به عنوان یک بیماری آشنا شوند.




Figure (10-2)



Figure (10-3)


آموزش پیشگیری از ایدز را باید  
از دبستان شروع کرد



Slide 10

Part (11-1)

با در نظر گرفتن میزان شیوع، گروههای اصلی پر خطر و در معرض خطر در کشور ما عبارتند از:



۱- مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر

۲- تن فروشان

۳- زندانیان

۴- همسران یا شرکای جنسی گروههای فوق

۵- نوجوانان و جوانان (گروه در معرض خطر)

### عوامل مساعد کننده (عوامل خطر) برای ابتلا به HIV/AIDS

Part (11-2)

#### اجتماعی

- مهاجرت (شغلی - تحصیلی، تفریحی و ...)
- بی‌سوادی، فقر، بیکاری
- سوء استفاده جنسی
- شیوع عفونت در جامعه

#### فردي

##### ساختار جسمی

جنس مونث در خطر بیشتری است

رابطه جنسی حفاظت نشده (بدون استفاده از کاندوم)

داشتن شرکای جنسی متعدد

رابطه جنسی مقعدی

بیماری‌های آمیزشی

استفاده مشترک از وسایل برندۀ و نوک تیز

(مثل سرنگهای مشترک - تبغ - سوزن‌های خال کوبی و ناتو و ...)

مواد مخدر تزریقی، معنادین الکل و مواد روانگردان (قرصهای X، شیشه و ....)



Part (11-3)

زندگی کودکان در دنیایی که ایدز از واقعیتهای آن است.




Figure (11-2)



Figure (11-1)



Slide 11

## راههای پیشگیری از عفونت HIV/AIDS

Part (12-1)



Figure (12-1)



- ۱- خویشن داری و به تاخیر انداختن اولین رابطه جنسی تازمان ازدواج با شریک جنسی ثابت (همسر) (پایبندی به اصول اخلاقی و خانوادگی، تقویت اعتقادات مذهبی و معنویات)
- ۲- وفاداری به شریک جنسی (همسر) در صورت وجود رابطه جنسی:
- (الف) استفاده از کاندوم به عنوان محافظ فیزیکی
  - (ب) محدود نمودن تعداد شرکای جنسی

 راههای پیشگیری از عفونت  
HIV/AIDS

در رابطه جنسی

توجه:

- ۰ در استفاده از کاندوم باید به: **تاریخ انقضای و کیفیت کاندوم** دقت کرد.
- ۰ هر یک عدد کاندوم فقط برای یک بار استفاده است.
- ۰ قرصهای ضد بارداری نقشی در پیشگیری از انتقال بیماری ایدز ندارند.




Figure (12-2)

## خویشن داری Abstinence چیست؟

Part (12-2)

خویشن داری یعنی این که فرد بتواند نیازهای خود را مدیریت کرده، ارضای آنها را به تعویق بیاندازد و به آنها در موقعیت‌های مناسب و به شیوه‌ای درست دست پیدا کند.

بنا براین:

**خویشنداری** به معنای سرکوب نیاز ها نیست بلکه تنظیم و مدیریت آنهاست.

**نکته:** خویشنداری در تقویت اعتماد به نفس و جرات افراد بسیار موثر است.



پیشگیری از ایدز بسیار آسان است، اگر الفبای پیشگیری از آن را رعایت کنیم ...

Part (12-3)



Figure (12-3)

**خویشن داری Abstinence = A**

به معنی خویشن داری تا سن ازدواج و داشتن شریک جنسی ثابت (همسر)

**وفداری به همسر = B**

به معنی وفاداری به همسر و کانون خانواده

**استفاده از کاندوم = C**

و پرهیز از رفتارهای جنسی محافظت نشده



Slide 12


**در مقابل درخواست رفتارهای پر خطر مانند:**

رفتار جنسی

- اعتیاد سنتی (تریاک و هروین) - الکل و حتی سیگار!


**از طرف دوستان یا افراد غریب، سه رفتار کلی وجود دارد:**


Figure (13-1)


**Rفتار منفعانه**

عذرخواهی بی مورد و افراطی

 نداشتن اعتماد به نفس، تضییع حق خود،  
خود کوچک انگاری، عدم توانایی گفتن نه

**Rفتار جرات مندانه**

اعتماد به نفس - حفظ احترام و حقوق انسانها

تصمیم گیری قاطع

**نه گفتن اول به نفس خود و بعد دیگران**
**Rفتار پرخاشگرانه**

تهدید - تضییع حق دیگران

برخورد توهین آمیز


**ازین سه رفتار فوق،**
**Rفتار جرات مندانه بهترین Rفتار میباشد که مایین دو Rفتار منفعانه و پرخاشگرانه است.**
**برای داشتن Rفتار جرات مندانه و توانایی گفتن نه باید تمرين، تمرين و تمرين کنیم.**
**Rفتارهای جرات مندانه و همچنین توانایی گفتن نه را  
باید از دوران خردسالی به کودکانمان بیاموزیم**


Figure (13-2)

## ... ادامه راه های پیشگیری

Part (14-1)



Figure (14-1)

- ۱) ترغیب جهت ترک اعتیاد
- ۲) تبدیل اعتیاد تزریقی به خوراکی یا نوشینی (در مراکز ترک اعتیاد)
- ۳) عدم استفاده از سرنگ و ابزار مشترک هنگام تزریقات (پخش سرنگ رایگان)
- ۴) در غیر اینصورت استفاده از مواد ضد عفونی کننده  
(مثل واپتکس یا آب جوش به مدت ۳۰ دقیقه) قبل از استفاده از سرنگ

راههای پیشگیری از عفونت  
**HIV/AIDS**  
در مصرف کنندگان  
تزریقی مواد مخدر

در همه حال : انجام آزمایش خون، آموزش و مشاوره بصورت دوره ای توصیه می شود.

**مراکز گذری کاهش آسیب:**

مراکزی هستند که با حمایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بهزیستی و عموماً در حاشیه شهرها و در مناطق با جمعیت پرخطر، ایجاد شده اند. معتادین تزریقی با مراجعه حضوری به این مراکز از انواع خدمات سلامتی اعم از دریافت امکانات تزریق سالم، آموزش، مشاوره، ارجاع به مراکز درمانی و .... بصورت **رایگان** برخوردار میشوند.




Figure (14-2)



Figure (14-3)

شعار سازمان انتقال خون :


**اهداء خون سالم اهداء زندگی**

Part (14-2)

**الف) مشاوره اولیه در افراد اهداء کننده خون**

ب) غربالگری تمام خونهای اهداء شده.

ج) استفاده از اهداء کنندگان دائمی خون

د) تبلیغ اهداء خون در گروههای کم خطر

راههای پیشگیری از عفونت

**HIV/AIDS**
**از طریق خونی**

ه) عدم استفاده مشترک از وسایل نوک تیز و برندۀ مثل تیغ، سوزن خال کوبی، تاتو و غیره

زمانی که خون یا مایعات خونی آلوده در مکانی ب瑞زد، باید اقدامات زیر را انجام داد:

۱- پوشیدن دستکش ۲- برداشتن مواد قابل جمع آوری با دستمال دارای قابلیت جذب

۳- شستشوی محل با آب و شوینده ها و ضد عفونی محل با واپتکس



Figure (14-4)

Part (14-3)

۱. رعایت دقیق موارد توصیه شده در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری

۲. استفاده از داروهای تجویز شده قبل و حین بارداری تحت نظر پزشک معالج

۳. استفاده از شیوه مناسب زایمان سازارین با نظر پزشک متخصص

۴. عدم شیردهی به نوزاد از سینه مادر مبتلا و تغذیه نوزاد صرفًا با شیر خشک

راههای پیشگیری از عفونت

**HIV/AIDS**
**از مادر به کودک**



Figure (15-1)

Part (15-1)

## ... ادامه راه های پیشگیری

۱. فرض بر اینکه تمام بیماران احتمال آلودگی به HIV را دارند
۲. استفاده از دستکش لاتکس حین انجام خدمات
۳. استفاده از عینک و ماسک حین انجام خدمات
۴. ضدغوفونی و استریل نمودن تجهیزات مورد استفاده

راه های پیشگیری از عفونت  
HIV/AIDS

کارکنان گروه پزشکی



## درمان؟

Part (15-2)

۱. اگر ویروس با هر روش انتقال وارد بدن یک فرد شود،  
دیگر هیچ وقت از بدن حذف نمیشود.
۲. برای این بیماری تاکنون واکسن موثر و یا درمان قطعی یافت نشده است.

در صورت شک به ابتلا و یا داشتن رفتارهای پر خطر و یا هرگونه سوال درمورد HIV/AIDS چه باید کرد؟

بهترین کار مراجعه به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرستان محل سکونت در اولین فرصت ممکن است.



Figure (15-2)

برای مراجعه به این مراکز مشاوره نیازی به معرفی پزشک نیست  
و هر کس می تواند بصورت مستقیم مراجعه کند.

در این مراکز مشاوره تمام اطلاعات مراجعین کاملاً محترمانه و خصوصی است

ارایه کلیه خدمات پیشگیرانه، بهداشتی و درمانی رایگان است

آدرس مراکز مشاوره ایدز و بیماری های رفتاری سراسر کشور:

[www.shepmode.com](http://www.shepmode.com)


[www.hiv-sti.ir](http://www.hiv-sti.ir)

توجه:



آدرس وب سایت:

[www.shepmode.com](http://www.shepmode.com)

ایdz و اجتماع

**پس:** فرد مبتلا به HIV/AIDS **فقط و فقط** یک بیمار است.



ضرورت مشاوره با افرادی که با HIV زندگی می‌کنند.



نگرش مثبت - رازداری - حمایت اجتماعی




نقش مردم در پیشگیری و کنترل بیماری ایدز؟

- ۱- شرکت در برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی، حمایت عمومی و انتقال آموخته های خود به دیگران
- ۲- کمک به افزایش سطح آگاهی و ایجاد نگرش صحیح نسبت به بیماری ایدز
- ۳- کمک به رفع تبعیض و رعوب و وحشت بی مورد و کاهش انگ و بدنامی نسبت به مبتلایان به ایدز در جامعه
- ۴- اصلاح رفتارهای پرخطر (جنسی - اعتیاد)



به نظر شما مفهوم این تصاویر چیست؟


Part (17-1)


**A جامعه**

 انگ و تبعیض  
بیماران را نابود میکند


۶

**B جامعه**

 پذیرش اجتماعی  
بیماران


۵



۴


**انتظار ما از شما شرکت کنندگان عزیز ....**

Part (17-2)

اطلاعات و آگاهی هایی را که کسب کرده اید در اختیار خانواده، فامیل، دوستان و همکاران خود قرار دهید  
تا بدینوسیله قدمی در جهت کنترل و پیشگیری از بیماری HIV/AIDS برداریم. انشا الله

Part (17-3)

**ایران عزیز پاینده باشی**

شما نیز می توانید به شبکه بزرگ کشوری مریان جامعه پیشگیری از ایدز پیونددید

Part (17-2)


[www.shepmode.com](http://www.shepmode.com)


زندگی صحته یکتای هنرمندی ماست هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

مدل جامع سیستماتیک آموزش و ارتقاء سلامت

آدرس وب سایت:

[www.shepmode.com](http://www.shepmode.com)


Slide 17