

آشنایی با عوارض مصرف کانابیس

(گل، حشیش، ماری جوانا و روغن حش)

(یاریگر هم باشیم)

کانابیس:

همان گیاه شاهدانه که ساقه، برگ‌ها، سرگل، صمع و غنچه آن حاوی ماده شیمیایی و ماده روان گردانی به نام دلتا^۹ تراهیدروکانابینول (THC) است. حشیش، گراس یا ماری جوانا، حش و گل از دسته کانابیس‌ها هستند که ماده اصلی آن THC است.

حشیش:

حشیش از گیاه شاهدانه به دست می‌آید. حشیش صمع متراکم شده و خشک شده گل‌های کانابیس است و برخلاف آن چه مردم تصور می‌کنند این ماده، واپستگی روانی شدید ایجاد می‌کند و در صورتی که طولانی مصرف شود، سندروم محرومیت یا ترک نیز به دنبال دارد. حشیش نه تاثیر مثبتی بر حافظه و تمکن دارد و نه تجرب عرفانی و خلاقیت. از آن جایی که حشیش، توهمندی زاست، عده‌ای توهمند ها را با تجرب عرفانی و خلاقیت اشتباه گرفته‌اند. همچنانی، مصرف حشیش، باعث اختلال در تمکن و توجه نیز می‌شود.

عوارض کوتاه مدت حشیش عبارت است از:

- افزایش اشتها
- سرخوشی و خنده خود به خود
- درک قوی تر رنگ، صدا و موسیقی
- قرمز شدن چشم
- احساس کند شدن گذر زمان
- عدم تعادل حرکتی
- اختلال توجه، تمرکز، حافظه و قضاوت
- افسردگی و اضطراب
- فشارخون
- توهם و هذیان
- افزایش اشتها

صرف طولانی مدت حشیش، علاوه بر تشدید مشکلات بالا، مشکلات متعددی بر سلامت جسمی افراد ایجاد می کند به خصوص افزایش احتمال سرطان، مشکلات تنفسی، جنون و اختلال در هورمون های جنسی زنان و مردان.

روغن حش:

روغن حشیش یا روغن ((حش)) عصاره ای است که از مواد خشک گیاه شاهدانه یا صمغ آن در حلال آلی استخراج می شود به آن ((بنگ)) هم می گویند.

ماری جوانا:

ماری جوانا جوانه و برگ گیاه خشک شده کانابیس است. ماری جوانا بیش از همه با سیگار مصرف می شود و ظرف چند دقیقه در خون قابل کشف است. میزان تی اج سی در ماری جوانا بسته به نسبت گل به برگ متغیر است ولی حشیش (رژین به دست آمده از گل ماده) تقریباً حاوی ۱۰ درصد تی اج سی است.

گل:

گل از خانواده کانابیس است و از گل های سرشاخه های گیاه شاهدانه تهیه شده و معمولاً بالاترین میزان تی اج سی را دارد. تاثیرات منفی گل چندین برابر بیشتر از حشیش است و پتانسیل قوی تری از ماری جوانا و حشیش در ایجاد توهם و اعتیادآوری دارد برای مثال میزان قدرت توهם زایی آن دو تا سه برابر بیشتر از ماری جوانا است.

آنار بلند مدت	آنار کوتاه مدت
احتمال ابتلا به آسم، برونشیت و سرطان ریه	افزایش فشار خون و احتمال غش کردن
افزایش احتمال ابتلا به بیماری های روانی	خواب آلودگی
کاهش هورمون تستسترون در مردان	احساس گرسنگی زیاد
افزایش هورمون تستسترون در زنان	سوء ظن، توهם و اضطراب شدید
کاهش مقدار اسپرم در مردان در نهایت عقیم شدن	کاهش بازداری رفتاری و حالت های بی قیدی
افزایش خطر نایاروری در زنان	اختلال در حافظه‌ی کوتاه مدت
کاهش انگیزه و علاقه	کاهش توانایی تمرکز حواس
فرمودن چشم	تشدید فعالیت و افزایش ضربان قلب

مؤسسه آمریکایی NIDA در تایید اینکه مواد دسته‌ی کانابیس اعتیاد‌آور است گزارش می‌کند وابستگان به ماده گل و حشیش پس از ترک تا دو هفته علائمی از قبیل، بیقراری، تحریک پذیری، وسوسه مصرف، اختلال خلق؛ فقدان انرژی، اختلالات خواب، بی‌اشتهایی، کسالت و درد بدنی دچار می‌شوند.

اشخاص معتاد به گل و حشیش در مسیر زندگی از ادامه تحصیل، خدمت سربازی، فعالیت‌های شغلی، انگیزه زندگی و سایر موفقیت‌های اکتسابی باز می‌مانند ولی هیچکدام از این عوارض را به اعتیاد گل و حشیش نسبت نمی‌دهند و همچنان اعتیاد خودشان را انکار می‌کنند.

National institute on drug abuse